

扫码关注12316专家短视频



答疑解惑

长春市张女士：如何鉴别河蟹的死亡时间

答:12月底之前,仍然是吃河蟹的好季节,鉴别河蟹的死亡时间有以下几点:看体色。刚死不久的河蟹背甲仍为青灰色,开始向淡黄色转变;闻气味。死亡时间稍长的有异味,死亡时间短的无异味;煮熟后甲壳内基本上无肉,是空的。(夏艳洁)

梨树县郑先生：成年牛每天需水量多少

答:牛的需求量常以采食饲料干物质估计,每采食1千克饲料干物质需水3.5-5.5千克。例如1头体重在200千克的生长牛,每天采食7千克的干物质,则需水在24.5-38.5千克。气温高时,需水量随之也高;还有就是母牛处于泌乳期,需水量也较高。(薄晓威)

通榆县王先生：谷子能重茬种植吗

答:谷子不建议重茬种植,主要是病虫害严重,特别是谷子白发病、锈病、线虫病、谷莠草等危害,所以不建议谷子重茬。谷子下茬可以种植大豆等双子叶作物,建议农户播前深翻,把草籽压下去,然后再播种。(王桂华)

长岭县孙先生：花生剥壳会影响播种吗

答:花生种子不宜剥壳太早,宜在播种前的10-15天进行。剥壳前应选择晴朗天气对种子进行充分晾晒两天左右,剥壳后严禁晒种,尽量采取人工剥壳,防止损伤种子。(刘书佳)



冬季如何保证蛋鸡正常产蛋率

畜牧兽医专家吴迪

近期,鸡蛋价格坚挺,是抓住时机提高饲养蛋鸡经济效益的大好时机。而东北冬季气温很低,影响产蛋率。为保证蛋鸡的正常产蛋率,冬季饲养蛋鸡需做好以下工作:

舍温适宜 保证蛋鸡产蛋期的最适舍温为20-25度,如果超出这个范围,就会影响产蛋率,如低于13度,就会降低产蛋率甚至停止产蛋。所以,冬季需采取必要措施提高鸡舍的温度,如建舍时就需考虑到鸡舍走向、高度、墙的厚度、窗户大小及通风口设置等因素。当冬季气温低时,应采取适当措施提高舍温,如安装地热、热风筒、火墙、电热管、暖气等。为提高舍温,也可适当增加饲养密度,如单笼增加只数或缩短排列间距。

空气畅通 冬季为提高舍温而关闭门窗,虽然提高了舍温,但会导致鸡舍内空气不流通,加之粪便中的有毒气体和水分使舍内空气潮湿、浑浊,直接影响鸡群的代谢,不仅影响产蛋率,还可能导致疾病发生,特别是呼吸道疾病的发生。因此,一定要保证鸡舍的空气流动,每天下午气温最高时,打开通风口或门窗通风30分钟,使内外空气交换。为保证舍温,在开窗前将舍温提高2度以保证舍内温度维持在正常范围。如舍内湿度过大,可在鸡舍内放置木炭、干稻草或生石灰并及时更换。

日粮全价 日粮是生长代谢的保证,开产后的日粮营养必须全价,其中粗蛋白含量应在15%左右,当产蛋率达到六层时,粗蛋白含量应达到16%以上,蛋层到八层时,粗蛋白应在16-18%之间,而且需含有两种不同的植物蛋白,必要时添加一定量的动物性蛋白,如鱼粉、肉骨粉或酵母粉等。日粮中的能量、微量元素、钙磷、盐含量必须达标,维生素要齐全,特别是维生素A和D3不可缺少。

管理科学 这是保证鸡群健康和正常产蛋及产蛋率高的关键,包括每昼夜的光照需达到16小时,夜间黑暗8小时,以保证鸡群充分休息。每天保证清洁饮水的充足供应,并保证饮水质量,不可饮凉水。投料要四定,定质、定量、定时、定人。每日定时清粪一次,清粪间隔不超过两天。保证周围环境安静,不能有较大声响,保证舍内不进入野生动物,应将通风口和窗户安装铁网,禁止无关人员进入鸡舍。

高产香菇菌棒生产技术(上)

食用菌专家 刘晓晓

栽培香菇产量低可能有多种原因,但主要还是因为使用的香菇品种退化、选择配方原料质量差或添加原料不合理、发菌期间温度高通风差、香菇菌棒转色差等多种原因造成的。

选择优质高产的香菇品种 栽培香菇选择品种非常重要,尤其是适合当地温度条件的香菇品种,比如我省主栽的香菇品种有0912、808等,这些品种适宜在凉爽的气候条件出菇,而原来推广的品种庆科20、L241-4等品种由于长期无性扩繁菌种严重退化,栽培少。

选择优质原料和适宜配方 栽培香菇使用阔叶硬杂木屑,木屑中不能含有化学物质和工业油等,要求不结块、无霉变。也可以选择利用圆木下脚料加工的木屑,但使用量不超过木屑总量的1/3,尽量使用枝丫材切碎的阔叶硬杂木屑。麦麸要求片状,新鲜干燥、无霉变。建议选用香菇高产配方:阔叶硬杂木屑82%、麦麸15%、豆饼粉2%、石膏粉1%,培养料含水量55%-58%。在培养料中添加2%豆粉,主要使香菇菌棒第三潮菇后产量稳定,有后劲,提高产量。培养料含水量不能低于54%,否则香菇菌丝生长细弱,产量低。

木屑预湿或提前拌料 采用拌料机拌料的,木屑在室内提前2天喷水堆积预湿,即将木屑平摊在地上,厚50厘米,边喷水边拌木屑,最后将木屑堆成长条形料堆,让粗木屑充分预湿,以掰开大块木屑中心水分均匀为度,预湿后木屑含水量在50-55%。采用人工拌料的,可在袋装的头一天将所有培养料搅拌均匀,边拌料边喷水,使培养料拌匀,含水量达到60%,经过一晚堆叠预湿,粗木屑可以充分吸水,第二天再喷水拌料装袋。

拌料装袋封口 按照原配方称取原辅材料,根据拌料机料斗容积确定每次拌料量和培养料比例,保证配料准确。4立方米容量的搅拌机加入3.68立方米的木屑、27千克麦麸、6千克豆粉、2.91千克石膏,搅拌七八分钟后测定培养料含水量55-58%。香菇栽培采用15厘米×55厘米×0.055厘米规格的聚乙烯折角袋,使用卧式装袋机装袋,装料后料袋长40厘米,料袋重2.1-2.2千克/袋,将装好的料袋口散料倒净后使用卡扣机封紧袋口。

农民售粮的“加法”与“减法”

农产品价格分析预测专家 梁琦

农民年年售粮,总是关注啥时候涨价,能涨多少?关于售粮,不要只算价格上涨的“加法”,还要注意到粮食保管不当造成的损失“减法”。“加法”能多赚钱,“减法”会带来损失,实际上这两者存在辩证关系。

农民忙活一年,都想多收入。但每家情况不同,一概“猜价格、赌行情”等待上涨,并不可取。在农村田间庭院,每年都有因坏粮造成损失的情况。前几天,公主岭市某合作社理事长咨询玉米行情咋样?他准备12月份售粮。我问他有多少玉米,咋存放的?他告诉我300万斤,“地趴”式存放。正好那几天公主岭市一直在下雨。

这么大的量,根本没处盖,上边浇着雨,地也没封冻,玉米的品种肯定繁多,水分差异在5-6个,湿度大了,轻则底层玉米会出现生芽,重则发生霉变。我告诉他,现在是价格上扬的时候,是售粮的最好时机,这么大的量,保管有风险,不能等待,涨不涨价还是未知数。应该卖掉三分之一或二分之一,余下的用铲车翻晒,首先保证粮食安全,其次是等待价格,再次也要资金回笼。

今年7月,我去桦甸市为高素质农民讲课,了解到桦甸某农民,他的70万斤玉米在每斤1.42元时没有出售,非要等到每斤1.7-1.8元时再出售,结果春耕过后,玉米价格降到每斤1.3元左右,

更是不认可,索性就不卖了。就是这个地方,有的农民玉米存放了三年没有出售,基本失去商品性了。新粮下来了,陈粮还有市场吗?存放时间越久,粮食质量下降,赔的就越多,这就是“减法”。

农民售粮的兴奋点总是关注涨价信息,很少关注储粮、售粮环节中“加减法”的辩证关系。市场瞬息万变,不会以我们的意志为转移,要顺应市场规律,因地、因粮、因量、因人制宜,科学规划好储粮、售粮时间。信息来源越多,越要辨别信息发布者的真正意图,量力而行,算好“加法”,审时度势,规避“减法”,才能成为市场的赢家。

螨病易发生在冬季和秋末春初,因为此期间日光照射不足,牛毛长而密,特别是在厩舍潮湿、牛体卫生状况不良,皮肤表面湿度较高的条件下,最适合螨的生长、发育和繁殖。此外,舍饲时密度增大,也为传染创造了条件。

牛螨病,又称为疥癣,俗称为癞病,是由牛疥螨、牛足螨、牛痒螨(包括水牛痒螨)和牛蠕形螨寄生于体表一定部位而引起的慢性寄生虫性皮肤病的统称。

螨病是一种接触性传染病,既可以由病牛与健康牛接触而感染,也可以通过间接接触的方式感染,如螨虫

扩展的特征外,不同螨引起的症状略有差异。疥螨,开始于面部、颈部、背部、尾根等被毛较短的部位,病情严重时,可遍及全身,幼犊牛感染时可引起死亡。痒螨,初期见于颈部两侧,垂肉和肩胛两侧,严重时蔓延到全身,病牛表现奇痒,在各种物体上摩擦,或以舌舐患部,后期被毛逐渐脱落,淋巴渗出形成棕褐色痂皮,皮肤增厚失去弹性,严重者精神萎靡、食欲大减、卧地不起最终死亡。足螨,寄生于尾根、肛门附近和蹄部,呈现红肿、渗出、脱毛和结痂。蠕形螨,一般初发于头部、颈部、肩部、背部或臀部,形成小如针尖至大如核桃的白

冬季应加强牛螨病防治

畜牧兽医专家 张守印 杨宏

及其虫卵污染了厩舍、用具等,健康牛与这些地方或用具接触而感染。此外,还可因饲养人员或兽医等污染的衣服和手等传染。

各种螨类在体外的生活期限,随温度、湿度和阳光照射强度等多种因素的变化而差异较大。疥螨,一般仅存活3周左右,在18-20℃和空气湿度为60%时,经2-3天死亡,而在7-8℃时,则经15-18天才死亡;足螨,在体外可存活约21天;痒螨的抵抗力较强,如6-8℃和85-100%空气湿度时,在厩舍内可存活2个月,牧场上能存活35天,在零下2-12℃时4天死亡,在零下25℃时约6小时死亡;蠕形螨,在体外阴暗潮湿的环境中可生存约21天。

螨病的临床症状,除具有剧痒、湿疹性皮炎、脱毛,患部逐渐向周围

色囊肿,常见的为黄豆大,内含粉状物或脓状液体,并有各期螨虫;也有只出现鳞屑而无疮疖的。

诊断时根据临床症状、病史等做出初步诊断,确诊需进行病原检查。

常用治疗药物有有机磷杀虫药(敌百虫、螨净等)、拟除虫菊酯类(溴氰菊酯)、甲脞类(双甲脞)和伊维菌素4类。用药方法有局部涂擦、喷洒、药浴及皮下注射。

治疗时应注意的杀虫剂均有毒性,在局部涂药时,其涂擦面积不能超过整个躯体面积的三分之一;一般药物只对成螨有效,不能杀死虫卵,故间隔5-7天应再次用药。

厩舍要干燥、透光,垫草要勤换,加强消毒,发现病牛及时隔离,新引进的牛隔离观察一段时间后再混群。

免费 搭建供求桥梁,连接城乡市场,为农民朋友发布农产品、畜禽、种苗及闲置物品的供求信息,欢迎来电来信。 联系电话:0431-88600735

或拨打12316新农村热线 12582农信通热线

求购

- 长春地区 玉米120吨,1.3元/斤,长春市双阳区鹿乡镇孙先生。电话:15948263106 通化地区 二手打豆机器一台,1000-2000元,柳河县三源浦镇张先生。电话:1327835358 辽源地区 白鹅3000只,8元/只,辽源市西安区灯塔乡王先生。电话:13766085771

延边地区 大量谷草,价格面议,敦化市孙先生。电话:13043378373

出售

- 长春地区 稻花香大米,5元/斤,榆树市大岭镇。电话:13756331661、13074389832 白菜20吨,0.3元/斤,榆树市八号镇刘先生。电话:15567042756 五角枫树苗,1-2年生,长春市净月高新技术开发区李先生。电话:13578654803 黑豆1万斤,3元/斤,农安县万金塔乡孙先生。电话:13159681495 粉碎机(粉饲料)1台,1200元/台,农安县新农乡左先生。电话:15947802536 8年生王族海棠1000棵,150元/棵,德惠市边岗乡郭女士。电话:18744184191

- 大公鸡1600只,15元/斤,农安县伏龙泉镇邹女士。电话:13500862193 榆树20棵,300元/棵,德惠市米沙子镇梁先生。电话:18744181614 黑腿笨鸡1000只,16元/斤,长春市九台区苇子沟镇张先生。电话:15948211718

吉林地区

- 常年出售中草药喂养老抗鸡蛋,永吉县于先生。电话:15590628181 常年出售西门达尔牛,吉林市杨先生。电话:15843775177 常年出售散养藏香猪肉礼盒,舒兰市李女士。电话:13234324222 四平地区 牛150头,1.5万元/头,伊通县营城镇张女士。电话:15044465057 黑豆7000斤,2.2元/斤,双辽市双山镇李女士。电话:15500418987

松原地区 杨树苗和杨树50万棵,松原市宁江区新城乡万先生。电话:18343827069

通化地区

- 桑黄、灵芝孢子粉,通化县高女士。电话:18626537627 常年出售蔬菜大棚保温棉被、养殖场保温棉被,梅河口市周先生。电话:13634352838

白城地区

常年出售绿色种植小麦面粉,大安沈先生。电话:15844654488、15143636865

白山地区

长白山赤灵芝,野黑蜂蜜,长白山自家种植基地灵芝孢子粉,敦化市孟女士。电话:4001801778、15844385121

延边地区

达维254、110,辽榛8号等多个品种大果榛子,敦化市李先生。电话:15844346245